

Anestesia Mepisv 3%

Anestésico inyectable



Clasificación Terapéutica:
Anestésico

Composición:
Anestésico Inyectable local a base de Clorhidrato de Mepivacaína sin vasoconstrictor.

Ventajas

- No contiene metilparabeno.
- Fórmula consagrada y de eficacia comprobada.
- Embalaje en blisters lacrados con 10 ampollas, lo que disminuye la contaminación externa.
- Acondicionados en ampollas de cristal que permiten visualizar mejor el reflujó sanguíneo.
- Disminuyen el dolor durante la aplicación debido a que el émbolo siliconado se desplace más suavemente.
- Conserva la eficiencia del producto durante todo su tiempo de validez debido a que el cristal no es poroso.

Indicaciones:

- Produce anestesia pulpar de 20 a 40 minutos y en tejidos blandos de 2 a 3 horas.
- Ideal para procedimientos de corta duración.
- Procedimientos en odontopediatría
- Pacientes portadores de cardiopatías graves o para quienes está contraindicado el uso de vasoconstrictores.
- Pacientes asmáticos e hipertensos.
- Gestantes, principalmente en el primer y tercer trimestre de gestación.
- Instalación de bandas ortodóncicas, etc.

Dosis máxima:

4,4 mg/kg. No pasar de 5,5 ampollas.

Presentaciones:

Caja con 50 ampollas de 1,8 ml, acondicionados en blisters lacrados con 10 ampollas cada uno.